



SEMENTES DE **SOJA**

CONVENCIONAL



Catálogo





Desde 1984 a CJ Selecta

atua com pioneirismo na fabricação de produtos derivados de soja para diversos segmentos. Com sede em Uberlândia/MG, uma unidade industrial em Araguari/MG, um escritório comercial em São Paulo/SP e várias filiais espalhadas pelo Brasil, a companhia é hoje uma das maiores exportadoras de Concentrado Proteico de Soja (SPC, na sigla em inglês soy protein concentrate), com fontes de soja transgênica e não transgênica.

Com 39 anos de mercado, em 2017 a empresa passou por uma grande transformação após ter seu controle operacional adquirido pelo grupo sul-coreano CJ CheilJedang. Até então conhecida como Sementes Selecta, a companhia passa a se chamar CJ Selecta, tornando-se parte de um dos maiores conglomerados do mundo em alimentos, produtos farmacêuticos, biotecnologia, entretenimento, mídia, compras para casa e logística.

A companhia é hoje parte da CJ Bio Division, líder global em biociência a partir do desenvolvimento de produtos que atendem às necessidades do cliente com base na biotecnologia sustentável. Com foco em oferecer soluções ambientalmente amigáveis, nos últimos 50 anos a empresa vem trabalhando no desenvolvimento de tecnologias de ponta para microrganismos, tornando-se referência no mercado de aminoácidos alimentares e nucleotídeos fermentados para alimentos.





FILOSOFIA

Contribuir para o desenvolvimento econômico nacional e a vida das pessoas através dos negócios. Maximizar a capacidade das pessoas talentosas e criar um ambiente de respeito. Buscar lucro e prosperidade através da gestão racional e inovação.



MISSÃO

Contribuir para a comunidade global fornecendo o melhor valor com nossos produtos e serviços OnlyOne.



Ser referência global em produtos ESG

Ser referência global em nutrientes de soja, com inovação, qualidade e sustentabilidade.



VALORES

OnlyOne:

Alcançar a liderança com competência fundamental sendo os primeiros, melhores e diferentes.

Talento:

Tornar-se líder com talentos excepcionais e cultura corporativa excepcional.

Crescimento compartilhado:

Ser respeitado pela sociedade por compor ecossistemas e criar valor compartilhado.

Princípios que orientam nossas ações:

Integridade, paixão, respeito e criatividade.

Índice

SEMENTES DE SOJA CONVENCIONAL

▶ BRS 546

▶ BRS 511

▶ BRS 284

▶ BRSMG 534

▶ BRS 573

▶ BRS 7583

▶ BRS 8381

▶ B66C22

▶ B71C25

▶ B72C22

▶ B74C22

▶ B75C22

▶ B76C23

▶ K78C21

▶ B80C23

▶ B82C25

BRS 546



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Cor da Flor
ROXA

Cor da Pubescência
MARROM MÉDIA

Cor do Hilo
MARROM MÉDIA
Acamamento
RESISTENTE

Altura Média de Planta
79 cm

Peso médio de 1.000 grãos
156 g

Potencial de ramificação
MÉDIO

Grupo de Maturação
6.8

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Moderadamente resistente
Oídio	Moderadamente resistente**
Podridão parda da haste	Resistente**
Podridão radicular de <i>Phytophthora</i>	Resistente*
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da Necrose da Haste	Resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Moderadamente resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Resistente
Nematoide de cisto	Suscetível

*Teste para resistência de campo; ** Avaliação de campo

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOClimática		SET			OUT			NOV			DEZ		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS		
MG	303												108	280.000 a 300.000
	304												105	300.000 a 340.000
	301												105	300.000 a 340.000
GO	302												105	300.000 a 340.000
	303												108	280.000 a 300.000
	304												108	300.000 a 340.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

■ Época de plantio preferencial
■ Época de plantio tolerada

BRS 511



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento INDETERMINADO	Cor do Hilo MARROM CLARO	Peso médio de 1.000 grãos 185 g
Cor da Flor ROXA	Acamamento MODERADAMENTE RESISTENTE	Potencial de ramificação ALTO
Cor da Pubescência CINZA	Altura Média de Planta 98 cm	Grupo de Maturação 6.9

REAÇÃO A DOENÇAS	
Cancro da haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Resistente
Oídio	Moderadamente resistente**
Ferrugem asiática	Resistente (lesão RB***)
Podridão parda da haste	Resistente**
Podridão radicular de <i>Phytophthora</i>	Resistente
Mosaico comum de soja	Resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Moderadamente resistente
Nematoide do cisto*	Suscetível

*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo.
***Lesão RB ("Reddish-Brown" marrom avermelhada, caracteriza reação de resistência)

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOCLIMÁTICA		SET			OUT				NOV				DEZ		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		2ºS	3ºS	4ºS	1ºS	2ºS	3ºS	4ºS	1ºS	2ºS	3ºS	4ºS	1ºS	2ºS		
MG	302														110	260.000 a 300.000
	303														112	240.000 a 280.000
	301														105	300.000 a 340.000
GO	302														105	300.000 a 340.000
	303														110	260.000 a 280.000
	304														108	280.000 a 300.000
	401														108	280.000 a 320.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude
**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região



Época de plantio preferencial
Época de plantio tolerada

BRS 284



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Cor da Flor
ROXA

Cor da Pubescência
CINZA

Cor do Hilo
MARROM CLARO

Acamamento
MODERADAMENTE RESISTENTE

Altura Média de Planta
90 cm

Peso médio de 1.000 grãos
146 g

Potencial de ramificação
ALTO

Grupo de Maturação
7.1

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Resistente
Podridão parda da haste	Resistente**
Podridão radicular de <i>Phytophthora</i>	Moderadamente resistente*
Mosaico comum de soja	Suscetível
Vírus da necrose da haste	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Moderadamente resistente
Nematoide do cisto*	Suscetível

*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo.

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOCLIMÁTICA		SET		OUT			NOV				CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS		
MG	302										112	260.000 a 280.000
	303										110	280.000 a 300.000
GO	301										108	300.000 a 320.000
	302										110	300.000 a 360.000
	304										110	280.000 a 300.000
	401										108	300.000 a 320.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

■ Época de plantio preferencial
■ Época de plantio tolerada

BRSMG 534



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Cor da Flor
ROXA

Cor da Pubescência
CINZA

Cor do Hilo
MARROM CLARO

Acamamento
MODERADAMENTE RESISTENTE

Altura Média de Planta
89 cm

Peso médio de 1.000 grãos
186 g

Potencial de ramificação
MÉDIO A ALTO

Grupo de Maturação
7.2

REAÇÃO A DOENÇAS

Pústula bacteriana	Resistente
Mancha olho-de-rã	Resistente
Cancro da haste	Resistente
Oídio	Moderadamente resistente**
Ferrugem asiática da soja	Resistente (lesão RB***)
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Moderadamente resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Moderadamente resistente

*Teste para resistência de campo; **Avaliação de campo; ***Lesão RB ("Reddish-Brown" marrom avermelhada, caracteriza reação de resistência)

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOCLIMÁTICA		SET		OUT				NOV				DEZ		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS				
MG	302												114	220.000 a 260.000	
	303												110	240.000 a 280.000	
GO	301												108	260.000 a 280.000	
	302												110	280.000 a 300.000	
	303												115	240.000 a 280.000	
	401												108	280.000 a 300.000	

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

Época de plantio preferencial
 Época de plantio tolerada

BRS 573



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Cor da Flor
BRANCA

Cor da Pubescência
CINZA

Cor do Hilo
MARROM CLARO

Acamamento
RESISTENTE

Altura Média de Planta
75 cm

Peso médio de 1.000 grãos
157 g

Potencial de ramificação
ALTO

Grupo de Maturação
7.3

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Moderadamente resistente
Oídio	Moderadamente resistente**
Podridão parda da haste	Moderadamente resistente**
Podridão radicular de <i>Phytophthora</i>	Resistente*
Mosaico comum de soja	Moderadamente resistente
Vírus da necrose da haste	Tolerante
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Suscetível
Nematoide do cisto	Suscetível

*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo.

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOCLIMÁTICA		SET		OUT				NOV				CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS			
MG	302											115	280.000 a 300.000
	303											115	260.000 a 280.000
GO	301											115	280.000 a 300.000
	302											113	260.000 a 300.000
	303											115	240.000 a 280.000
	304											114	260.000 a 280.000
	401											113	280.000 a 300.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

 Época de plantio preferencial
 Época de plantio tolerada

BRS 7583



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Cor da Flor
BRANCA

Cor da Pubescência
MARROM CLARA

Cor do Hilo
MARROM CLARO

Acamamento
RESISTENTE

Altura Média de Planta
95 cm

Peso médio de 1.000 grãos
160 g

Potencial de ramificação
MÉDIO

Grupo de Maturação
7.5

REAÇÃO A DOENÇAS

Mancha olho-de-rã	Resistente
Pústula bacteriana	Resistente
Cancro da haste	Resistente
Crestamento bacteriano	Resistente
<i>Meloidogyne javanica</i>	Moderadamente resistente

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOTIMÁTICA	SET		OUT				NOV				DEZ	CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS		
GO	304											113	240.000 a 260.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

■ Época de plantio preferencial
■ Época de plantio tolerada

BRS 8381



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
SEMIDETERMINADO

Cor da Flor
ROXA

Cor da Pubescência
CINZA

Cor do Hilo
PRETA IMPERFEITA

Acamamento
RESISTENTE

Altura Média de Planta
95 cm

Peso médio de 1.000 grãos
140 g

Potencial de ramificação
ALTO

Grupo de Maturação
8.3

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Moderadamente resistente
Pratylenchus brachyurus	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Moderadamente resistente
Nematoide do cisto	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOLIMÁTICA		OUT				NOV				DEZ				CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		1ºS	2ºS	3ºS	4ºS	1ºS	2ºS	3ºS	4ºS	1ºS	2ºS	3ºS	4ºS		
MG	304													130	160.000 a 200.000
	301													130	200.000 a 220.000
GO	304													125	180.000 a 220.000
	401													125	200.000 a 220.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

 Época de plantio preferencial
 Época de plantio tolerada

B66C22



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Acamamento
RESISTENTE

Peso médio de 1.000 grãos
180 g

Potencial de ramificação
MÉDIO A ALTO

Grupo de Maturação
6.9(M3)

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da Haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Suscetível
Pústula bacteriana	Resistente
Podridão radicular de <i>Phytophthora</i>	Resistente
Nematoides	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOClimática		SET		OUT			NOV			CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)	
		5ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS			4ªS
MG	302										112	240.000 a 300.000
	303										108	240.000 à 300.000
	304										103	280.000 a 320.000
GO	301										105	280.000 a 320.000
	302										100	280.000 a 320.000
	303										102	280.000 a 320.000
	304										105	260.000 a 320.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

■ Época de plantio preferencial
■ Época de plantio tolerada

B71C25



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Peso médio de 1.000 grãos
175 g

Grupo de Maturação
7.1

Acamamento
RESISTENTE

Potencial de ramificação
MÉDIO

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da Haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Moderadamente resistente
Pústula bacteriana	Resistente
Nematoide de cisto à raça 3	Resistente
Nematoide de cisto às raças 6, 9, 10, 14 e 14+	Moderadamente resistente
Nematoide de galha	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOCLIMÁTICA		SET		OUT			NOV				CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		5ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS		
MG	302										115	220.000 a 260.000
	303										112	220.000 a 260.000
	304										108	240.000 a 280.000
GO	301										108	240.000 a 280.000
	302										104	240.000 a 280.000
	303										106	240.000 a 280.000
	304										108	220.000 a 280.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

Época de plantio preferencial
 Época de plantio tolerada

B72C22



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Peso médio de 1.000 grãos
175 g

Grupo de Maturação
7.2

Acamamento
RESISTENTE

Potencial de ramificação
MÉDIO

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da Haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Suscetível
Pústula bacteriana	Resistente
Nematoide de cisto à raça 3	Resistente
Nematoide de cisto às raças 6, 9, 10, 14 e 14+	Moderadamente resistente
Nematoide de galha	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOCLIMÁTICA		SET		OUT			NOV				CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		5ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS		
MG	302										118	220.000 a 260.000
	303										114	220.000 a 260.000
	304										110	240.000 a 280.000
GO	301										111	240.000 a 280.000
	302										107	240.000 a 280.000
	303										109	240.000 a 280.000
	304										111	220.000 a 280.000
	401										111	240.000 a 280.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude
**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

Época de plantio preferencial
 Época de plantio tolerada

B74C22



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Acamamento
RESISTENTE

Peso médio de 1.000 grãos
180 g

Potencial de ramificação
MÉDIO

Grupo de Maturação
7.4

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da Haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Suscetível
Pústula bacteriana	Resistente
Nematoide de cisto à raça 3	Resistente
Nematoide de cisto às raças 14 e 14+	Moderadamente resistente
Nematoide de galha	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOCLIMÁTICA		SET		OUT			NOV				CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		5ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS		
MG	302										122	200.000 a 240.000
	303										118	200.000 a 240.000
	304										111	200.000 a 240.000
GO	301										114	200.000 a 240.000
	302										110	200.000 a 240.000
	303										112	200.000 a 240.000
	304										114	200.000 a 240.000
	401										114	200.000 a 240.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

Época de plantio preferencial
 Época de plantio tolerada

B75C22



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Acamamento
RESISTENTE

Peso médio de 1.000 grãos
180 g

Potencial de ramificação
MÉDIO

Grupo de Maturação
7.7(M3)

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da Haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Suscetível
Pústula bacteriana	Resistente
Nematoide de cisto	Suscetível
Nematoide de galha	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOClimática		SET					OUT					NOV					CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		5ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS		
MG	302																130	200.000 a 240.000
	303																125	200.000 a 240.000
	304																118	180.000 a 240.000
GO	301																118	200.000 a 240.000
	302																116	200.000 a 240.000
	303																116	200.000 a 240.000
	304																118	200.000 a 240.000
	401																118	200.000 a 240.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

■ Época de plantio preferencial
■ Época de plantio tolerada

B76C23



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento INDETERMINADO	Peso médio de 1.000 grãos 175 g	Grupo de Maturação 7.6
Acamamento RESISTENTE	Potencial de ramificação MÉDIO	

REACÇÃO A DOENÇAS	
Cancro da Haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Moderadamente resistente
Pústula bacteriana	Moderadamente resistente
Nematoide de cisto à raça 3	Resistente
Nematoide de cisto às raças 6, 9, 10, 14 e 14+	Moderadamente resistente
Nematoide de galha	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOCIMÁTICA		SET					OUT					NOV					CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		5ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS		
MG	302																124	200.000 a 240.000
	303																120	200.000 a 240.000
	304																114	180.000 a 240.000
GO	301																116	200.000 a 240.000
	302																112	200.000 a 240.000
	303																114	200.000 a 240.000
	304																116	200.000 a 240.000
	401																116	200.000 a 240.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude
**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

Época de plantio preferencial
Época de plantio tolerada

K78C21



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Peso médio de 1.000 grãos
175 g

Grupo de Maturação
7.8

Acamamento
RESISTENTE

Potencial de ramificação
MÉDIO

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da Haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Suscetível
Pústula bacteriana	Moderadamente resistente
Nematoide de cisto à raça 3	Resistente
Nematoide de cisto às raças 6, 9, 10, e 14	Moderadamente resistente
Nematoide de galha	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOCLIMÁTICA			SET	OUT					NOV				CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
			5ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS			
MG	302											130	200.000 à 240.000	
	303											125	200.000 à 240.000	
	304											118	180.000 à 240.000	
GO	301											118	200.000 a 240.000	
	302											116	200.000 a 240.000	
	303											116	200.000 a 240.000	
	304											118	180.000 a 240.000	
	401											118	200.000 a 240.000	

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

Época de plantio preferencial
 Época de plantio tolerada

B80C23



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento
INDETERMINADO

Acamamento
RESISTENTE

Peso médio de 1.000 grãos
180 g

Potencial de ramificação
MÉDIO

Grupo de Maturação
8.0

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da Haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Moderadamente resistente
Pústula bacteriana	Resistente
Nematoide de cisto	Suscetível
Nematoide de galha	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOLIMÁTICA		SET					OUT					NOV					CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		5ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS		1ªS	2ªS	3ªS	4ªS			
MG	302																128	180.000 a 220.000
	303																128	180.000 a 220.000
	304																122	180.000 a 220.000
GO	301																120	180.000 a 220.000
	302																118	180.000 a 220.000
	303																118	180.000 a 220.000
	304																120	180.000 a 220.000
	401																120	180.000 a 220.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude

**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

■ Época de plantio preferencial
■ Época de plantio tolerada

B82C25



CARACTERÍSTICAS

Tipo de Crescimento INDETERMINADO	Peso médio de 1.000 grãos 175 g	Grupo de Maturação 8.2
Acamamento MOD. RESISTENTE	Potencial de ramificação MÉDIO	

REAÇÃO A DOENÇAS	
Cancro da Haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Resistente
Pústula bacteriana	Resistente
Nematoide de cisto	Suscetível
Nematoide de galha	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO

REGIÃO EDAFOClimática		SET					OUT				NOV				CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
		5ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS	1ªS	2ªS	3ªS	4ªS		
GO	401														120	220.000 a 240.000

*População de acordo com fertilidade do solo, época de plantio e altitude
**Ciclo pode variar de acordo com época de plantio e região

Época de plantio preferencial
 Época de plantio tolerada



NUTRIENTES ESSENCIAIS
PARA A VIDA

. Produtos de soja . Fertilizantes
. Sementes

NOSSA EQUIPE COMERCIAL

Filial | Araguari

 34 **99203.1817**

Filial | Unaí

 38 **99885.8755**

Filial | Catalão

 62 **99945.4187**

Filial | Uberaba

 34 **99140.1991**

Filial | Ibiã

 34 **99985.6413**

Filial | Rio Verde

 62 **99700.4836**

Filial | Uberlândia

 34 **99124.5370**

Filial | Coromandel

 34 **99982.3475**

Filial | Mato Grosso

 62 **99700.4836**

62 **99964.0871**

34 **99816.3382**

Filial | Patrocínio

 34 **99826.6609**



plantnutrition.cjselecta



Plant Nutrition CJ Selecta



cjselecta.com.br

